

# Male Circumcision

Male circumcision is the removal of the foreskin around the end of the penis. If you decide on circumcision, your baby's doctor will do it in the nursery. If your baby is small or has any medical problems, the circumcision may need to be done later. The doctor will have you sign a consent form before the circumcision is done.

## During the Procedure

- The doctor will put a numbing medicine gel on the penis.
- Your baby may be offered a pacifier dipped in sugar water to ease pain.
- Your baby's legs will be held still while the foreskin is removed.
- Vaseline gauze may be placed around the end of the penis for the first 24 hours. This is to prevent the penis from sticking to the diaper.
- The procedure will last 5 to 10 minutes.

## Your Baby

- Your baby may be fussy, not eat well or sleep more for the first 24 hours.
- Hold and comfort your baby.
- Redness, swelling and a small amount of bleeding may occur for the first 48 hours.
- As it heals, yellowish-white patches may appear. Do not try to wipe these off. The patches will go away as the circumcision heals.

## Care After Circumcision

- Clean the penis gently with warm water each day. Pat dry.
- Watch for signs of infection such as redness, swelling or a foul odor.
- Put a small amount of petroleum jelly such as Vaseline at the end of the penis. Do this for 5-7 days each time you change the diaper.
- Your baby can take a tub bath after the circumcision is healed and the umbilical cord has fallen off.

# Circuncisión masculina

La circuncisión es la extirpación del prepucio alrededor del extremo del pene. Si se decide por la circuncisión, el médico de su bebé la realizará en la sala de recién nacidos. Si su bebé es pequeño o si tiene algún problema médico, la circuncisión se puede realizar más adelante. El médico le hará firmar un formulario de consentimiento antes de realizarla.

## **Durante el procedimiento:**

- El médico colocará un medicamento en gel en el pene para adormecerlo.
- Le puede ofrecer un chupón untado en agua azucarada a su bebé para aliviar el dolor.
- Se sujetarán las piernas del bebé mientras se extrae el prepucio.
- Le pueden colocar una gasa con vaselina alrededor del extremo del pene durante las primeras 24 horas, para evitar que el pene se pegue al pañal.
- El procedimiento durará de 5 a 10 minutos.

## **Su bebé**

- Es posible que su bebé esté irritable, no coma bien o duerma más durante las primeras 24 horas.
- Sostenga y consuele a su bebé
- Es posible que se produzca enrojecimiento, hinchazón y algo de sangrado durante las primeras 48 horas.
- A medida que cicatriza, pueden aparecer manchas amarillentas. No trate de limpiarlas, desaparecerán a medida que la circuncisión cicatriza.

## **Cuidados después de la circuncisión**

- Limpie el pene suavemente con agua tibia a diario. Seque con golpes suaves.
- Observe si hay señales de infección como enrojecimiento, hinchazón o mal olor.
- Coloque una pequeña cantidad de vaselina en el extremo del pene durante 5 a 7 días cada vez que cambie el pañal.
- Puede darle un baño de tina a su bebé después que la circuncisión haya cicatrizado y el cordón umbilical se haya caído.

**Call Your Baby's Doctor if there is:**

- A lot of bleeding or large areas of blood on the diaper
- Increased redness or swelling
- A foul odor
- No urine output within 12 hours of the circumcision

**Talk to your baby's doctor if you have any questions or concerns.**

**Llame al médico de su bebé si hay:**

- sangrado abundante o grandes áreas con sangre en el pañal;
- aumento del enrojecimiento e hinchazón;
- mal olor;
- falta de eliminación de orina dentro de las 12 horas siguientes a la circuncisión.

**Hable con el médico de su bebé si tiene alguna pregunta o duda.**

2/2007. Developed through a partnership of Mount Carmel Health, Ohio State University Medical Center, and OhioHealth, Columbus, Ohio. Available for use as a public service without copyright restrictions at [www.healthinfotranslations.com](http://www.healthinfotranslations.com).

Male Circumcision. Spanish.