

# Barium Swallow


A barium swallow is an x-ray that checks for problems in your throat, esophagus, stomach and small intestine. You drink a white chalky liquid called barium to get pictures on x-rays.

**If you are breastfeeding, pregnant, or think you might be, tell the staff before the x-ray is taken.**

**Arrive on time for your test.** The test takes about 15-45 minutes. You may need to stay for up to 6 hours for more x-rays if your small intestine is being looked at.

## To Prepare

- Do not eat or drink anything, including water, after midnight before the test.
- Do not smoke after midnight before the test.
- If you need to take your medicines the morning of the test, take them with sips of water only.




# Esofagograma con contraste de bario

Un esofagograma con contraste de bario es una radiografía que determina si hay problemas en la garganta, esófago, estómago e intestino delgado. Se bebe un líquido blanco terroso llamado bario para obtener imágenes con rayos x.

**Si está amamantando, está embarazada o cree estarlo, avísele al personal antes de que le tomen la radiografía.**

**Llegue puntualmente a su examen.** El examen dura entre 15 y 45 minutos. Puede ser necesario quedarse hasta 6 horas para tomarle más radiografías si se está examinando su intestino delgado.



## Preparación

- No coma ni beba nada, ni siquiera agua, después de la medianoche anterior al examen.
- No fume después de la medianoche anterior al examen.
- Si tiene que tomar medicamentos la mañana del examen, tómelos solamente con pequeños sorbos de agua.

## **During the Test**

- You will wear a hospital gown.
- You are given 1 or 2 barium drinks. The drink tastes chalky and may be flavored.
- X-rays are taken as the barium flows down your esophagus into your stomach. You may need to stand or lie on a table for the x-rays. The table is moved in many positions. As you move, the barium coats the inside of your stomach and intestines. More x-rays are taken as the barium moves through your body.
- If you are to have x-rays of your small intestine, it may take up to 6 hours to complete your test.

## **After the Test**

- Your stool will be light colored for 2-3 days after the test.
- Drink 6-8 glasses of liquids after the test. This will help remove the barium from your body and keep you from being constipated.
- Test results are sent to your doctor. Your doctor will share the results with you.

## **Durante el examen**

- Usará una bata de hospital.
- Se le darán 1 ó 2 bebidas de bario. La consistencia de las bebidas es terrosa y pueden tener saborizante.
- Se toman las radiografías a medida que el bario fluye por su esófago hacia el estómago. Puede que tenga que estar de pie o recostarse sobre una camilla para que le tomen las radiografías. La camilla se pone en varias posiciones. A medida que se mueve, el bario recubre el interior del estómago y de los intestinos. Se toman más radiografías a medida que el bario se desplaza por su cuerpo.
- Si se le van a tomar radiografías del intestino delgado, puede que el examen dure hasta 6 horas.

## **Después del examen**

- Sus deposiciones serán de un color claro durante 2 a 3 días después del examen.
- Beba de 6 a 8 vasos de líquido después del examen. Esto ayuda a eliminar el bario del cuerpo y a evitar el estreñimiento.
- Los resultados del examen se le envían a su médico, quien a su vez le informará a usted el resultado de los mismos.

**Call your doctor if you have:**

- Barium in your stool 3 days after the test
- A thin stool or notice a change in your bowel habits
- Stool that is not normal in 3 days
- Pain in your lower abdomen or stomach

**Call your doctor right away if you:**

- Cannot stop vomiting
- See blood when you vomit or have blood in your stool

**Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.**

**Llame a su médico si tiene:**

- dolor en las deposiciones 3 días después del examen;
- deposiciones delgadas o si nota un cambio en sus hábitos de evacuación;
- deposiciones que no son normales en 3 días;
- dolor en la parte inferior del abdomen o del estómago.

**Llame a su médico de inmediato si:**

- no deja de vomitar;
- nota sangre en el vómito o en las deposiciones.

**Hable con su médico o enfermera si tiene alguna pregunta o duda.**

4/2006. Developed through a partnership of The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health and OhioHealth, Columbus, Ohio. Available for use as a public service without copyright restrictions at [www.healthinfotranslations.com](http://www.healthinfotranslations.com).